


















Bolile cu transmitere sexuală























| Boala | Controlul obligatoriu | Diagnostic | Semne clinice de boală care sunt posibile |
|---|-------------------------|--|---|
| Gonoree (Sculament) | La fiecare 6 săptămâni | verificarea mostrei  analiză de urină  |  Secreție gălbuie și mirositor din penis, vagin sau fund  Dureri, mâncărime sau dureri la urinare  Dureri în gât după sex oral |
| Sifilis (Lues) | La fiecare 12 săptămâni | analiză de sânge  |  Noduri sau ulcere pe penis, vagin, fund sau în gură  Dilatarea ganglionilor limfatici |
| HIV/SIDA | La fiecare 12 săptămâni | analiză de sânge  | Deseori mult timp fără simptome |
| Chlamydia | Nu | verificarea mostrei  analiză de urină  |  Secreție gălbuie și mirositoare din penis, vagin sau fund  Dureri, mâncărime sau dureri la urinare  Dureri în gât după sex oral  Dureri la sex |
| Hepatită B sau C - infecție a ficatului transmisibilă | Nu | analiză de sânge  |  Desori fără simptome Icter/gălbănare |

Informații esențiale:

- Dacă aveți sifilis, gonoree sau HIV pozitiv vi se va reține cartea de sănătate (cartea de control).
- Deasupra este nevoie de controale ginecologice! Controlul obligatoriu nu include de exemplu controlul Papanicolau. Bărbații au nevoie de controale urologice în plus. Recomandarea: minim controlul anual, de exemplu www.docfinder.at
- Vă rugăm frumos, să vă adresați doctorilor dacă aveți semne de boli.
- Austria are tratamente bune pentru aceste boli.
- Unele boli necesita tratarea partenerilor!
- Există vaccinuri contra cost contra hepatitei B și virusul HPV. Intrebați doctorii!

Căli de infectare și protecție

-1-

| Căli de infectare | Boli posibile | Protecție înainte de infectare |
|--|---|---|
| Sex vaginal  | HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia | prezervativ  |
| Sex anal   | HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia | prezervativ  |
| Sex oral   | HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia | prezervativ, folie pentru sex oral   |
| Sărutul   | Sifilis, hepatită B | nu vă sărutați   |
| Mâna, jucării sexuale   | Sifilis, gonoree, chlamydia | prezervativ, folie pentru sex oral, mănuși din latex    |
| sânge  | HIV, hepatită B sau C | prezervativ, mănuși din latex, evitați contactul cu sânge    |

Sex oral fără protecție = risc de infecție! (de exemplu sifilis sau HIV,...)

Administrarea corectă a prezervativului:

- Penisul trebuie să fie ferm în erecție, când aplicați prezervativul!
- Prepuțul se trage în jos, capătul prezervativului se ține apăsat cu degetele și se aplică pe penis.
- Capătul prezervativului trebuie strâns în timp ce se aplică prezervativul!
- Derulați prezervativul de-a lungul penisului, până la baza penisului
- După ejaculare retragerea penisului trebuie făcută înainte să iasă din erecție, ținând prezervativul la baza penisului.



Dacă aveți **întrebări** adresați-vă la un **centru de consiliere** pentru femei care prestează servicii sexuale! Acolo veți primi ajutor și consiliere **gratuită și anonimă!** Adresele le găsiți în broșura "Sexwork-Info". Această broșură o primiți de exemplu la centrele de control în Austria!

| Metodă | Mecanică | | Hormonală | Chimică | | Naturală |
|---|--|--|---|---|---|---|
| Anticonceptionale | ♂ ○ Prezervativ | ♀ ○ Diafragmă ○ Diafragmă cu aplicare cervicală | ♀ ○ Pilulă ○ Contraceptivele injectabile ○ Plasturele ○ Dispozitivul hormonal ○ Inelul contraceptiv ○ Implantul | ♀ ○ Sterilet | ♀ ○ Supozitor ○ Creme ○ Comprimate | ♀ ○ Măsuratul temperaturi ○ Metoda calendarului |
| Descriere | A se aplica peste penisul ferm în erecție înainte de actul sexual Previne sarcina și infecții cu transmitere sexuală. | Se plasează înaintea actului sexual pe fundul vaginului astfel încât să acopere colul uterin. Previne să intre spermatozoizii în colul uterin.. | Se primește la ginecolog. Previne prin schimbarea hormonilor în corp posibilitatea sarcinii. | Ginecologul aplică în colul uterin. Previne implantarea în ovule fecundate. Înlăturarea de către ginecolog este posibilă. A se schimba după aproximativ 3-5 ani. | Se plasează înaintea actului sexual în vagin. Omoară spermatozoizii. | Prevede zilele fertile și nefertile. Este deasupra nevoie folosirea anticonceptionalelor, de exemplu prezervativul, în zilele fertile. |
| Siguranța la aplicarea corectă | ○ Sexshop ○ Magazin ○ Farmacie | ○ Se recomandă vizita la ginecolog ○ Farmacie | ○ Este nevoie de o vizită la ginecolog | ○ Este nevoie de o vizită la ginecolog | ○ Farmacie | |
| Siguranța la aplicare corectă | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ |
| Protecție contra bolilor cu transmitere sexuală | DA | NU | NU | NU | NU | NU |

„Pilula de a doua zi“ – doar în caz de urgență: trebuie luată în timp de 72 de ore după contactul sexual neprotejat.- și se da fără rețetă în farmacie sau la ambulanțe ginecologice (în spital). **Nu protejează** împotriva bolilor transmisibile sexual și HIV/SIDA!

Softtampons (tamponare tip burete): nu protejează împotriva bolilor transmisibile sexuale, HIV/SIDA, și sarcini nedorite.

Editorul: AG Prostitution im Rahmen der Task Force Menschenhandel. Toate specificările în această publicație sunt fără garanție cu totul că au fost cercetate cu atenție. Editorul nu își asumă nici o responsabilitate.

Sursa de imagini: Cu autorizarea și suportul Centralei Federale pentru informarea sănătății/ Germania - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Deutschland (www.bzga.de).